Liste der in der Beerenkultur bewilligten Herbizide 2010

Herbizidtyp / Wirkstoffe	Handelsname	Firma	Allgemeine Angaben			Kulturen							Wirkung der Herbizide gegen wichtige Einjährige																										
Wirkung: ● = gute Wirkung ⬩ = Teilwirkung ❍ = ungenügende Wirkung	Diese Liste ist unverbindlich. Angaben zu den Produkten (inklusive zu den entsprechenden Firmen) sind auf dem Internet unter folgender Adresse zu finden: www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=de		◀ Erlaubt in der IP ◀ Erlaubt mit Einschränkung	Wirkstoffgehalt g/l	Konzentration l-kg/ha	Erdbeere	Himbeere	Johannisbeere/Cassis	Stachelbeere	Brombeere	Heidelbeere	Holunder	Gänsefuss	Amarant	Hirtentäschelkraut	Melde	Wolfsmilch	Erdrauch	Kletten labkraut	Gänsedistel	Taubnessel	Kamille	Bingelkraut	Nachtschatten	Vogelmiere	Ackergauchheil	Hohlzahn/Gluren	Stiefmütterchen	Portulak	Hederich	Knöterich
Blattherbizid																																						
Diquat	Diquat Diquat Omya Mission Reglone	Schneiter Agro Omya Agrichem Syngenta, Stähler, LG		200	4	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	●	●	●	●	●	●	●	⬩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glufosinate	Basta	Bayer, Omya	◀	200	4-5	*x* ①	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*		●	●	●	●	●	●	●	⬩	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glyphosat	Diverse Prod.	Agrichem, Bayer, Burri, Hoko, LG, Méoc, Monsanto, Omya, Schneiter, Sintagro, Stähler	◀	61-450	2-25					*x*			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phenmedipham	Beetup Betam LG Sugaro Beta Betanal SC 471 Betaren Phenmedipham	Stähler Leu-Gygax Syngenta Bayer Burri Agricide Agrichem, Sintagro	◀	157 157 157 471 160 160	2 x 3 2 x 3 2 x 3 2 x 0.75-1 2 x 3 2 x 3	*x*							●			●	●	❍	⬩	❍	⬩	●	⬩	❍	⬩	●	⬩	⬩	●	⬩	❍	●	⬩						
Wuchsstoffe (IP: max.1 Behandlung pro Jahr)																																						
MCPB	Divopan MCPB Trifolin	Syngenta LG, Omya, Schneiter, Sintagro Stähler	▲	400	4		*x*	*x*	*x*				●	❍	●	●	❍	⬩	❍	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍			❍	⬩			
Bodenherbizid (IP : alle Bodenherbizide dürfen nur mit niedrigen Aufwandmengen spätestens bis 30. Juni eingesetzt werden (ausser bei Erdbeeren und Chikara bei Heidell																																						
Dichlobenil	Blackengranulat Dichlobenil-G Sprion G	Schneiter Sintagro Leu-Gygax	▲	7.5% 7.5% 6.75%	20-60 20-60 20-60			*x*					●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flazasulfuron	Chikara 25 WG	Stähler	◀	25%	0.2						*x*					●			⬩	❍		●	●	❍	●	●			●		⬩									
Lenacil	Lenacil	Leu-Gygax, Schneiter, Racroc	▲	80%	1.5-2.5	*x*							⬩	❍	●	●	❍	⬩	❍	⬩	●	●	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	❍	❍	⬩	⬩								
Metamitron	Betavel Goltix WG 70 Metamitrone	Burri Agricide Leu-Gygax Médol	▲	700	1.5	*x*							●		●	●	⬩	⬩	❍	●	⬩	●	❍	⬩	●	⬩	●	●	●	●	⬩	⬩						
Metazachlor	Butisan S	Leu-Gygax, Syngenta	▲	500	1.5-2.5	*x*							⬩	❍	●	●	❍	❍	❍	●	●	●	⬩	●	●	●	●	⬩	⬩	⬩	⬩						
Napropamide	Devrinol Fl Napronol Nikkel	Stähler Schneiter Omya	▲	450	2.5-3	*x*							●	⬩	⬩	●	●	⬩	●	⬩	⬩	●	⬩	●	●	⬩	●	❍		❍	⬩						
Napropamide + Metazachlor	Devrinol plus	Stähler	▲	351 110	3-4	*x*							●		●	●	●	⬩	●	●	●	●	⬩	●	●	●	●	⬩	⬩	⬩	⬩						
Oryzalin	Surflan	Syngenta	▲	480	6-8		*x*	*x*	*x*	*x*			●	●	❍	●			❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	❍	❍	●	❍	❍						
Oxyfluorfen	Goal	Maag	▲	240	2-3			*x*	*x*	*x*	*x*		●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	❍	❍	●	●	●	●	●						
Pethoxamid	Successor 600	Stähler	▲	600	2	*x*							⬩	●	●	⬩	❍	⬩	❍	⬩	●	⬩	❍	●	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩						
Propachlor	Propachlore flüssig Ramrod flowable	Omya Leu-Gygax	▲	500 480	8-9 8-9.5	*x*							⬩		●	⬩	❍	⬩	❍	⬩	●	●	❍	⬩	⬩	⬩	⬩	❍	⬩	❍	❍						
Propyzamyde	Kerb Flo	Omya, Dow AgroSciences		400	2.4 -4				*x*	*x*			⬩	⬩	●	❍	⬩	❍	❍	❍	❍	⬩	⬩	●	●	⬩	❍	❍	❍	●	❍						
Ungräser (IP: max. 1 Behandlung pro Jahr)																																						
Clethodim①	Centurion Prim Select	Stähler	▲	120 240	1-2 0.5-1	*x*																																
Cycloxydim	Focus Ultra	Leu-Gygax	▲	100	1-6	*x*																																
Fluazifop-P-Butyl	Fusilade Max	Syngenta	▲	125	1.5-3	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*																												
Haloxyfop-R-Methyl-Ester	Gallant 535	Omya	▲	108	0.3-1.5	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*																										
Propaquizafop	Agil	Syngenta	▲	100	0.75-2	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*																												
Quizalofop-P-Ethyl	Targa Super	Bayer	▲	50	0.75-2.5	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*																												

Pflanzenschutzmitteln mit beendeter Zulassung, mit einer Verwendungsfrist			
Phenmedipham	Betanal	Syngenta	Ende Verwendungsfrist 31. Juli 2011.
Propyzamyde	Kerb	Syngenta	Ende Verwendungsfrist 31. Oktober 2011.
Simazine	Gesatop Quick Simazin 50 Simazin Omya	Syngenta Stähler, Schneiter Omya	Ende Verwendungsfrist 31. Dezember 2011.

Unkräuter und Ungräser																Bemerkungen
		Mehrjährige							Gräserarten							
Kreuzkraut	Ehrenpreis	Ackerkratzdistel	Löwenzahn	Ackergänsedistel	Rumex-Arten	Windengewächse	Grosser Wegerich	Quecke	Blut-/Fingerhirsen	Hühnerhirse	Einjähriges Rispengras	Raygras	Borstenhirsen			Grundsätzlich Packungsangaben und Sortenempfindlichkeit beachten.
●	●	⬩	⬩	❍	❍	⬩	⬩	⬩	●	●	●	●	●			Ab 1. Standjahr. Brühvolumen: 300-1200 l
●	●	⬩	⬩	❍	❍	⬩	⬩	⬩	●	●	●	●	●			① Abbrennen von Ausläufern nur in Kombination mit Durchtrennen der Ranken.
●	●	●	●	●	●	⬩	●	●	●	●	●	●	●			Bis spätestens Ende Augsut. Keine grünen Pflanzenteile behandeln
●	⬩	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍			Vor der ersten Blütenbildung und nach der Ernte Splitverfahren
⬩	❍	●	⬩	●	●	●	●	❍	⬩	❍	❍	❍	❍			Erst nach dem Ausreifen der Triebe und Abschluss des Triebwachstums einsetzen.
beeren																
●	●	●			●	⬩	●	●	●	●	●	●	●			Frühling, vor Austrieb der Johannisbeersträucher, bei Vegetationsbeginn der Hauptunkräuter.
●	❍	❍			⬩	●			●	●	⬩					Anwendung: Ab 4. Standjahr, Nacherntebehandlung. Zugabe von 0.5 l/ha Exell.
⬩	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	⬩	❍			Nicht auf sandigen Böden einsetzen. Eignung bei humusreichem Boden. Split 2 x 0.75 kg/ha
●	⬩	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	⬩	⬩	●	❍	⬩			Splitverfahren 2 x 1 kg/ha.
●	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	⬩	●	⬩	●			Ohne Vermehrungsanlagen. Nach dem Pflanzen.
●	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	●	●			Behandlung: 4–5 Tage nach der Pflanzung auf den unkrautfreien Boden spritzen und mit max. 5mm beregnen
●	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	●	●			4 Wochen nach dem Pflanzen auf den unkrautfreien Boden spritzen und mit max. 5mm beregnen
❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	●	●			Brühevolumen: 500–1000 l/ha. Ab 2. Standjahr. Keine direkte Anwendung auf die grünen Teile der Kulturpflanzen. Nicht a Sandboden.
●	●	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	⬩	❍	●	●	●	●	●			Anwenden auf neu aufgelaufene Unkräuter im 2–4-Blattstadium.
⬩		❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	⬩	●			Anwendung: Vor- oder unmittelbar nach der Pflanzung. Anwendung bis spätestens Ende August. Mischbar mit 1.5l/ha Beetup oder mit 8 l/ha Ramrod.
●	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍	❍	●	●	●	⬩	●			Anwendung in Kombination mit Lenacil empfohlen. Behandlung: 5–8 Tage nach der Pflanzung. Nicht unter Tunnel. Frigo-Setzlinge dürfen nicht behandelt werden.
⬩		❍	❍	❍	❍	❍	❍	⬩	●	●	●	●	●			Brühevolumen: 1000 l/ha. Von Ende Oktober bis Mitte Januar, nicht auf gefrorenem Boden ausbringen.
								●	●	●	●	●	●			
								●	●	●	❍	●	●			① Clethodim = 1 Behandlung pro Jahr Select = Tankmischung mit 0.5% Öl.
								●	●	●	❍	●	●			Niedrige Dosis gegen einjährige Ungräser, hohe Dosis gegen Quecke. Splitverfahren möglich.
								●	●	●	●	●	●			Erdbeeren: nur vor der Blüte und nach der Ernte.
								●	●	●	⬩	●	●			Brühevolumen: 300–500 l/ha.
								●	●	●	❍	●	●			Nicht anwenden bei kühlen Temperaturen (optimale Wirkung bei >10°C),