

Johannis-, Stachel-, Heidelbeeren, Holunder

Blattläuse	Nirpschildläuse	Kommasschildläuse	Austernschildläuse	Blattwespenlarven	Frostspanner	Spinnmilben	Johannisbeerglasflügler
------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------	-------------	-------------------------

Suisse Garantie mit Einschränkungen der SAIO:

							•
--	--	--	--	--	--	--	---

•				•	•		
---	--	--	--	---	---	--	--

Rotenon: Nur gegen Blattläuse, Blattwespen, Frostspanner; max. 2 Behandlungen/Jahr, Intervall mindestens 1 Monat

•							•
---	--	--	--	--	--	--	---

•							•
---	--	--	--	--	--	--	---

Vor der Blüte

Vor der Blüte

•		•					
---	--	---	--	--	--	--	--

Beim Austrieb

•	•				•	•	
---	---	--	--	--	---	---	--

Mineralöl: Nur gegen Schildläuse (inkl. SJS).

•	•		•		•	•	
---	---	--	---	--	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--

•	•	•		□	•		
---	---	---	--	---	---	--	--

Diazinon: Gegen Himbeerrindengallmücke, sonst nur bei Mehrfachindikationen.

•					•		
---	--	--	--	--	---	--	--

Phosalone: Nur bei Mehrfachindikationen, max. 1 Beh./Jahr. Ausserhalb des Bienenfluges.

•	•						
---	---	--	--	--	--	--	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt

					•		
--	--	--	--	--	---	--	--

Vor der Blüte

Nur ausserhalb des Bienenfluges spritzen

Wirkung auf:

Larven, Nymphen, Adulte							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Abamectin: Max. 1 Behandlung/Jahr. Vor der Blüte oder nach der Ernte

--	--	--	--	--	--	--	--

Eier, Larven						•	
--------------	--	--	--	--	--	---	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt / Vor der Blüte und nach der Ernte. Max. 1 Beh./Jahr

Eier, Larven, Nymphen						•	
-----------------------	--	--	--	--	--	---	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt / Vor der Blüte und nach der Ernte. Max. 1 Beh./Jahr

Pyrazole (Fenpyroximate, Fenazaquin, Tebufenpyrad): Max. 1 Behandlung/Jahr.

Larven, Nymphen, Adulte						•	
-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt / Max. 1 Beh./Jahr

Larven, Nymphen, Adulte						•	
-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt / Max. 1 Beh./Jahr

Alle Stadien						•	
--------------	--	--	--	--	--	---	--

◆ bei Heidelbeeren nicht bewilligt / Max. 1 Beh./Jahr

Eier, Larven, Nymphen							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Vor der Blüte und nach der Ernte

Überwinternde Weibchen							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Netzschwefel: Nur gegen Brombeermilbe. Beim Austrieb, vor der Blüte oder nach der Ernte. (Brombeer, nicht Himbeer)